



**МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН СЕКТОР „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”**  
**АПРИЛ, 2022**

**1. Баланс на предлагането и потреблението на  
сектор „Плодове и зеленчуци” април, 2022 г.**





**1.1. Плодове**

	 Ябълки	 Круши	 Десертно грозде
<b>Предлагане, тона</b>	<b>37 841</b>	<b>5 336</b>	<b>6 339</b>
Преходен остатък от 2021 г., тона	21 561	3 722	5 962
*Внос и вътреобщностни доставки, тона	16 280	1 614	377
<b>Потребление, тона</b>	<b>27 839</b>	<b>4 014</b>	<b>6 130</b>
Потребление за прясна консумация, тона	21 730	3 960	6 120
Потребление за преработка в страната, тона	6 100	0	0
*Износ и вътреобщностни доставки, тона	9	54	10

Източник: отдел Агростатистика МЗХГ, НСИ и собствени изчисления

\*Данните са за периода от 01.01.2022г. до 31.03.2022 г.

## 1.2. Зеленчуци

	Домати 	Картофи 	Краставици 	Пипер 
<b>Предлагане, тона</b>	<b>36 637</b>	<b>46 946</b>	<b>10 567</b>	<b>12 352</b>
Производство 2022 г. и преходен остатък от 2021 г. , тона	12 527	37 855	3 532	5 463
*Внос и вътреобщностни доставки, тона	19 110	9 091	7 035	6 889
<b>Потребление, тона</b>	<b>26 500</b>	<b>40 936</b>	<b>8 060</b>	<b>9 250</b>
Потребление за прясна консумация, тона	22 780	39 219	6 350	7 950
Потребление за преработка в страната, тона	0	1 690	0	0
*Износ и вътреобщностни доставки, тона	3 720	28	1 710	1 300

Източник: отдел Агростатистика МЗХГ, НСИ и собствени изчисления

\* Данните са за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

## 2. Анализ на пазара.

### Цени на едро /тържища/ и цени на дребно през април

#### 2.1. Цени на едро

Средномесечни цени на едро на основни плодове, лв./кг, април 2022г.

ПРОДУКТ	Февруари 2022	Март 2022	Април 2022	промяна в % април /март 2022	Април 2021	промяна в % 2022 / 2021
ЯБЪЛКИ	2.01	2.01	2.09	4.0	1.88	11.2
КРУШИ	2.78	2.85	3.17	11.2	2.75	15.3
КИВИ	2.54	2.51	2.60	3.6	2.44	6.6

Източници: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и Система за агропазарна информация (САПИ)

### При плодовете

- Всички наблюдавани плодове повишават цените си през април, като крушите поскъпват най-много - с 11,2%.
- На годишна база -април 2022/2021г., при ябълки и круши се отбелязва най-голям ръст на средномесечната цена – с 11.2 и 15,3%.

### Средномесечни цени на едро на основни зеленчуци лв./кг, април 2022 г.

ПРОДУКТ	Февруари 2022	Март 2022	Април 2022	промяна в % април/март 2022	Април 2021	промяна в % 2022 / 2021
КАРТОФИ	0.91	0.95	1.00	5.3	0.66	51.5
ЛУК ЗРЯЛ	0.78	0.83	0.96	15.7	0.74	29.7
ДОМАТИ	3.09	3.08	4.03	30.8	2.68	50.4
КРАСТАВИЦИ	4.70	3.90	3.60	-7.7	2.21	62.9
ЗЕЛЕ	1.15	1.22	1.34	9.8	0.92	45.7
МОРКОВИ	1.01	1.04	1.17	12.5	0.91	28.6
САЛАТИ бр.	-	1.05	0.93	-11.4	0.73	27.4
ЛУК ЗЕЛЕН вр.	-	0.72	0.62	-13.9	0.45	37.8

Източници: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и Система за агропазарна информация (САПИ)

### При зеленчуците

- Зеления лук, салатите и краставиците поевтиняват спрямо март с между 13.2% и 7.7%,а всички останали наблюдавани зеленчуци поскъпват през април.
- Най-голямо месечно увеличение на цените през април има при домати 30.8%, лука 15.7% и морковите 12.5%.
- В сравнение с 2021 г., през 2022 г. се повишават цените на всички наблюдавани зеленчуци, като най-голямо е повишението при краставици – 62.9%, картофи – 51,5% и домати 50.4%

## 2.2. Цени на дребно

### Средномесечни цени на дребно на основни плодове лв./кг.

Плодове	Април 2022	Април 2021
Ябълки	2.53	2.29
Киви	3.37	3.06
Круши	3.80	3.52

Източници: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и Система за агропазарна информация (САПИ)

При всички наблюдавани плодове се наблюдава повишение на цената на дребно спрямо миналата година.

### Средномесечни цени на дребно на основни зеленчуци лв./кг.

<b>Вид зеленчук</b>	<b>Април 2022</b>	<b>Април 2021</b>
<b>Домати</b>	<b>4.77</b>	<b>3.16</b>
<b>Зеле</b>	<b>1.71</b>	<b>1.14</b>
<b>Картофи</b>	<b>1.29</b>	<b>1.05</b>
<b>Краставици</b>	<b>4.32</b>	<b>2.74</b>
<b>Лук кромид</b>	<b>1.35</b>	<b>1.23</b>
<b>Моркови</b>	<b>1.56</b>	<b>1.34</b>
<b>Салати бр.</b>	<b>1.38</b>	<b>1.06</b>
<b>Лук зелен вр.</b>	<b>0.98</b>	<b>0.78</b>

*Източници: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и Система за агропазарна информация (САПИ)*

Всички наблюдавани зеленчуци поскъпват през 2022 г. спрямо април 2021 година.

### **3. Плодове и зеленчуци**

От късните есенни до ранните пролетни месеци относителният дял на българските плодове и зеленчуци на пазара е изключително нисък, но през летните месеци количествата българска продукция се увеличават.

Наблюденията върху пазара на зеленчуците и плодовете през м. април показват, че относителният дял на предлаганите количества българската продукция на стоки от тази група е по-малък от дела на продажбите от внос. Мониторингът на пазара на зеленчуци през месеца показва значителен превес на вносната продукция. Силно изразен е този превес при продажбите на домати (77%), картофи (78%), краставици (58%), лук (79%) Сравнително съпоставим е делът на българското зеле (35%:65%), а продадените количества български чесън са малко по-големи от вносните (55%:45%).

Наблюденията на пазара на плодове през април показват, че относителният дял на българската продукция е по-малък, тъй като все още няма производство и предлагане на български сезонни плодове. През втората половина на април започва предлагането на български ягоди, но техният относителен дял все още е много малък (11%). Незначителни са и количествата на българските круши, едва 9%. Търгуваните български ябълки през април са 36% от общите продажби.



Източник: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ)

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИТОСАНИТАРНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ КЪМ 05.05.2022 г.**

##### **СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ**

##### **Фенофаза:**

**Ябълки: (ВВСН 11/67)** „Първи развити листа (останалите все още не са развити)“/„Цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали“

**Круши: (ВВСН 57/67)** „Розов бутон“: удължаване на венчелистчетата; чашелистчетата леко отворени; поява на венчелистчетата“/„Цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали“

В област Пазарджик сравнително ниските температурни стойности за различните АЕР през месец април доведоха до забавяне на фенологичното развитие на трайните насаждения и риск от повреди за цветовете и младите завръзи на овощните видове.

##### **Контрол на вредителите:**

##### **Обикновена крушова листна бълха /*Cacopsylla pyri*/**

В област Пазарджик се наблюдава масово излюпване и вредна дейност на ларви от първо поколение на неприятеля. Плътността остава висока в градини с констатирано нападение.

##### **Листни въшки /*сем. Aphididae*/**

Начало на поява и вредна дейност е установена в областите: Благоевград, Враца, Кюстендил, Плевен, Пазарджик и Стара Загора. Образуване на колонии са установени в област Монтана. Плътност от 5-7% нападнати розетки се

наблюдава в област Благоевград, 2-4% в област Сливен и 10-13% в област Кюстендил, което е над ПИВ. В област Враца нападнатите летораста са 7-8 %. В област Плевен плътността е 4-8 бр./100 пъпки и 10-15 бр./100 летораста. Плътност под ПИВ от 7-8 бр. колонии/100 летораста е установена в област Пазарджик.

#### **Ябълков цветопробивач /*Anthonomus pomorum*/**

Начало на поява и вредна дейност на презимували възрастни индивиди е установена в област Монтана, където констатираната плътност е 1-9 бр./100 клона.

#### **Листозавивачки /сем. *Tortricidae*/**

В областите: Кюстендил, Пазарджик и София област е констатирано начало на вредна дейност на листозавивачки, отчетената популационна плътност не надвишава ПИВ.

#### **Листогризеци /сем. *Lepidoptera*/**

През първата половина на месец април начало на вредна дейност на листогризеци е установена в областите: Видин, Враца, Монтана, Пазарджик и Сливен.

#### **Ябълкова плодова оса /*Hoplocampa testudinea*/**

В края на втората десетдневка на месец април е установено начало на летеж в област Кюстендил и начало на яйцеснасяне в област Пазарджик. В област Кюстендил наблюдаваната плътност е под ПИВ ( 1-2 бр./100 стръсвания).

#### **Ябълков плодов червей /*Laspeyresia pomonella*/ = /*Cydia pomonella*/**

Отчетено е развитие на първо поколение на неприятеля. Начало на какавидиране е установено в област Бургас. Начало на летеж на пеперуди от първо поколение е констатирано през третата десетдневка на месец април в областите: Видин, Пазарджик и Търговище.

#### **Червен овощен акар /*Panonychus ulmi*/**

В област Благоевград е констатирана вредна дейност на възрастни и ларви, там популационната плътност е над ПИВ (3-6 бр./лист). В районите на Пазарджик и Пловдив е установено начало на излюпване на зимуващи яйца. Първи възрастни се наблюдават в област Пазарджик от края на месец април.

#### **Кръгломиниращ молец /*Cemistoma scitella* /= /*Leucoptera malifoliella*/**

Начало на летеж на пеперуди от първо поколение се наблюдава в областите: Враца и Пазарджик. Начало на яйцеснасяне е отчетено в областите: Видин с плътност от 1 бр. яйце/лист и Пазарджик с плътност от 1-2 яйца/лист.

### **Калифорнийска щитоносна въшка /*Quadraspidiotus perniciosus*/**

Начало на летеж на възрастни мъжки индивиди е установена в област Пазарджик в овощна градина с констатирано нападение от предходни години.

### **Мъхнат бръмбар /*Epicometis hirta*/**

Начало на вредна дейност на възрастното се наблюдава в овощни насаждения от ябълки в област Монтана, където плътността е 1-4 бр./100 розетки.

### **Струпяване по ябълката /*Venturia inaequalis*/**

Изгърмяване на аскоспори навън са констатирани в областите: Благоевград и Търговище. Първи петна по листата се наблюдават в областите: Благоевград и Ямбол. Нападение от първа степен (1-4% нападнати летораста) се наблюдава в област Благоевград.

### **Брашнеста мана по ябълката /*Podosphaera leucotricha*/**

Установена е поява на системна форма на патогена в областите: Благоевград, Кюстендил и Пазарджик. Констатирана е първа степен на нападение (3-5% нападнати летораста от дифузната форма на болестта). В област Кюстендил повредените клонки са 0-2 %.

## **КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ**

### **Фенофаза:**

**Праскови: ВВСН (31/72)** „Начало на развитие на леторастите: вижда се оста на развиващите се летораста“/„ Зеленият яйчник е заобиколен от чашелистчетата; някои от тях започват да падат“

**Кайсии: ВВСН (62/73)** „Отворени са около 20% от цветовете“/„ Вторично окапване на завръза“

**Череша и вишна: ВВСН (65/69/72)** „Пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета)“/„Край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета)“/„ Зеленият яйчник е заобиколен от чашелистчетата; някои от тях започват да падат“

**Сливи: ВВСН (69/72)** „Край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета)“/„ Зеленият яйчник е заобиколен от чашелистчетата; някои от тях започват да падат“.

В АЕР на Благоевград са отчетени 5-10 % измръзвания при праскови. Повреди по плодни пъпки, цветове и млади завръзи при костилкови овощни видове са наблюдавани в Шумен и Видин.

### **Контрол на вредителите:**

### **Източен плодов червей /*Grapholita(Aspila) molesta*/**

В югозападна България (АЕР Петрич и Сандански) в края на месец февруари и началото на месец март е регистрирана поява на пеперудите на източен

плодов червей, след което в резултат на застудяването летежа е преустановен до 25.03. Към края на месец април се наблюдава масов летеж. В районите на Пазарджик, Стара Загора и Ямбол през първата и втората десетдневка на месеца е отчетено начало на летеж на първо поколение на неприятеля, който запазва плътност при непроменен ареал на разпространение.

#### **Прасковен клонков молец /*Anarsia lineatella*/**

Вредна дейност на гъсениците от презимувалото поколение е отчетена през втората половина на месеца в областите: Благоевград, Бургас и Пазарджик. Масово в страната е проведено по едно вегетационно третиране. Третирани са 0,324 хил. ха. Отчетен е летеж на пеперуди от лятното поколение в област Благоевград.

#### **Черничева щитоносна въшка /*Pseudaulacspis pentagona*/**

Разпространена е в градини от Благоевградска област. Развитието и в заразените градини е по - бавно тази година в сравнение с предходните. В края на месец април е регистрирано излюпване на ларви от първо поколение.

#### **Листни Въшки /сем. *Aphididae*/**

Отчетено е повишаване на популационната плътност, но тя остава под ПИВ. Третирание е проведено в областите: Бургас и Плевен. Очаква се увеличение на плътността на неприятеля. В прасковените насаждения нападение от листни въшки е отчетено в областите: Пазарджик и Благоевград с плътност над ПИВ (3- 10 % нападнати летораста).

#### **Черна черешова листна въшка /*Myzus cerasi*/**

До момента плътността на неприятеля е под ПИВ. Третирани са черешови насаждения в областите: Благоевград и Пазарджик. Има тенденция за увеличаване плътността на неприятеля. Извършено е едно пръскане на 0,480 хил. ха в областите: Бургас и Пазарджик.

В черешовите насаждения вредят различни видове **Листозавивачки /сем. *Tortricidae*/**, **Педомерки /сем. *Geometridae*/**, **ларви на Костилкоплодова листна оса /*Neurotoma nemoralis*/** Плътността на неприятелите е под ПИВ. След цъфтежа е проведено едно третиране на 0,470 хил. ха в областите: Пазарджик и Сливен. Предстои третиране и в други области след преминаване на фаза „цъфтеж“ на черешите.

#### **Вишнев хоботник /*Rhynchites auratus*/**

И през пролетта на 2022 г. плътността на неприятеля във всички райони на страната остава под ПИВ. Третирание е проведено на 0,269 хил. ха в област Разград.



### **Черна сливова плодова оса /*Hoplocampa minuta*/**

През месец април е отчетен летеж, яйцеснасяне и начало на излюпване на лъжегъсениците на осата. Проведени са от едно до две пръскания преди и след цъфтежа на сливите.

### **Сливов плод червей /*Laspeyresia funebrana*/=*Grapholita funebrana*/**

През настоящата година е отчетено по-рано начало на летеж по феромон на неприятеля, в сравнение с предходната година. Запазва се постоянен летеж в уловките. Не са проведени третираня.

### **Брашнеста мана по праскова /*Sphaerotheca pannosa var. Persicae*/**

В област Бургас са извършени третираня срещу болестта. Нападнатите площи над ПИВ са 0,360 хил. ха.

### **Къдравост по праскова /*Taphrina deformans*/**

Третиранията срещу зимуващата форма на къдравостта в по-голямата част от страната приключи до средата на месец април. Първи повреди от болестта са отчетени през втората десетдневка на месеца в областите: Благоевград, Пазарджик и Разград, като до момента не са констатирани съществени поражения.

### **Ранно кафяво гниене /*Monilinia laxa*/**

В резултат от благоприятните климатични условия се наблюдават поражения от патогена при костилковите видове. Процентът на нападение при черешите не е висок - до 3-5% повредени цветове и клонки. При кайсиите, в област Разград се наблюдават поражения по цветовете (1-3 %), а по листа и летораста в района на Пазарджик. Проведени са профилактични предцъфтежни и следцъфтежни третираня по културите.

### **Сачмянка /*Stigmina carpophila*/**

От началото на месец април са установени прояви на болестта по листата на черешите в слаба степен на нападение. Проведено е едно до две профилактични пръскания на 1,709 хил. ха. Установени са първи прояви на сачмянка по сливи.

### **Бяла ръжда (цилиндоспориоза) по черешата и вишната /*Blumeriella jaarii*/**

Проявление на цилиндоспориоза по листата на череша и вишна до момента не е установено. Предпазно следцъфтежно третиране е проведено на 0,100 хил. ха в област Пазарджик.

## **ЛОЗЯ**

### **Фенофаза:**

**ВВСН (01/08)** „Начало на набъбване на пъпките: пъпките започват да се разрастват вътре в обвивката“/„Разпукване на пъпките: ясно се виждат зелени върхове на леторастите“

### **Контрол на вредителите:**

#### **Шарен гроздов молец /*Lobesia botrana*/**

През месец април е установено начало на летеж на неприятеля в областите: Бургас, Пловдив, Пазарджик и Търговище, а в района на Благоевград се наблюдава масов летеж и начало на яйцеснасяне. Отчетения летеж на молеца е слаб.

#### **Жълт лозов акар /*Schizotetranychus viticola*/**

Установено е активизиране на възрастните женски в областите: Бургас и Пловдив.

#### **Ескориоза /*Phomopsis viticola*/**

Първи симптоми на болестта се наблюдават в района на Бургас. Предпазни третирания срещу ескориоза са извършени на 2,750 хил. ха. в областите: Варна и Пловдив.

#### **Брашнеста мана /*Oidium tuckeri*/**

Симптоми на болестта са констатирани в област Благоевград. В област Пловдив са извършени предпазни третирания на 2,500 хил. ха.

## **КАРТОФИ**

### **Фенофаза:**

**ВВСН (01/09)** „Начало на покълване на семената поява на кълнове (<1 mm)“/„Поникване: стъблата излизат над почвената повърхност“ - за средно-ранни и късни сортове

**ВВСН (10/29)** „Първите листенца започват да нарастват“/„Поява на 9 или повече основни странични разклонения (> 5 cm)“ - за ранни сортове

### **Контрол на вредителите:**

#### **Колорадският бръмбар /*Leptinotarsa decemlineata*/**

Първите установени повреди от възрастните на неприятеля са регистрирани в област Благоевград (АЕП Петрич). Там са третирани 0,007 хил. ха. Начало на излизане от зимните убежища на колорадски бръмбар е констатирано в област Пазарджик.

#### **Телени червеи /сем. *Elateridae*/**

Внесени са инсектициди срещу неприятеля при засаждане на картофите на 0,605 хил. ха.

**Картофен молец /*Phthorimaea operculella*/**

Установено е начало на летеж на картофен молец в заложените феромоновы уловки в областите: Кюстендил и Пазарджик.

**Картофена мана /*Phytophthora infestans*/**

Срещу патогена е извършено първо предпазно третиране на площ от 0,083 хил. ха в област Благоевград (АЕР Петрич).